

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penjabaran kasus diatas, pasien S mengalami gagal jantung stage III. Udem, Asites, batuk, dan nafas sesak yang dialami pasien merupakan manifestasi klinis dari gagal jantung yang dialami oleh pasien. Di RS punten dilakukan 2 terapi yaitu terapi Farmakologi diberikan beberapa obat yaitu dobutamin, furosemid, miniaspi, vipalbumin, laxadin, alprazolam, spironolakton, ramipril, digoksin, acetylcystein, cetirizine, dan allopurinol. Terapi non farmakologi yang diberikan pada pasien adalah diet rendah garam, tempat tidur pasien yang semifowler atau setengah duduk untuk mempermudah pasien bernafas.

5.2 Saran

Saran yang dapat saya sampaikan untuk rumah sakit punten sehingga dapat meningkatkan pelayanan kefarmasian yang ada di instalasi farmasi yaitu:

1. Sebaiknya melakukan monitoring secara langsung bekerjasama dengan dokter dan tim medis lain. Intensif berkomunikasi dengan dokter,tim medis.
2. Selain memberikan edukasi kepada pasien sebaiknya memberikan edukasi juga kepada keluarga pasien. Terutama bila pasien tersebut merupakan anak-anak atau pasien dengan usia lanjut.