

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Penggunaan paracetamol, omeprazole dan infus asering sudah tepat pada saat penanganan pertama sebelum hasil lab keluar dan sesuai dengan keluhan pasien. Pada saat terdiagnosa atau suspek DHF maka pasien diberikan psidii sirup untuk meningkatkan trombosit. Pada hari terakhir pasien mengalami petechiae yang disebabkan karena DHF dan tidak diberi obat karena penyebab petechiae sudah teratasi. Namun pasien mengeluh gatal di area tangan yang kemungkinan disebabkan karena adanya alergi namun perlu ditinjau lebih lanjut untuk gatal yang dikeluhkan pasien.

5.2 Saran

Perlu dilakukan peninjauan penyebab gatal di daerah tangan dan mendapatkan petechiae secara detail sehingga penyusun bisa mengetahui seberapa parah petechiae yang dialami pasien. Selain itu perlu dilakukan pengecekan SOAP pada instalasi dan perawat. Karena pada saat pasien pulang penulis sedang menyiapkan obat yang kurang tepat dan pada saat dikonfirmasi dikatakan bahwa kemungkinan data belum direvisi atau belum sinkron antara instalasi farmasi dan perawat. Selain itu mungkin PKL bisa dilakukan visit pada pasien dengan standart protokol yang sesuai sehingga pasien dapat lebih mengerti gambaran lebih luas tentang lapangan kerja tidak hanya dalam instalasi farmasi.