

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Menurut analisa dari pemantauan terapi obat dan analisa pasien memang tidak rutin dan tidak patuh dalam meminum obat. Penggunaan Antibiotik mencegah timbulnya infeksi dan menurunkan luka bengkak pada kaki pasien. Penggunaan Antibiotik sebaiknya dibatasi (tergantung pada indikasi pemberian obat) dan dapat diterima dengan baik oleh pasien (tidak menimbulkan alergi pada obat). Kesimpulan yang diambil pasien memang menderita Diabets Melitus Tipe 2. Pada saat Keluar Rumah Sakit (KRS) pasien mendapatkan obat yang sama tetapi Metformin sudah tidak diberikan. Untuk antidiabetes pasien hanya mendapat Injeksi Lanctus karena organ pancreas pada pasien sudah tidak dapat memproduksi insulin maka dari itu pasien hanya diberikan terapi injeksi lantus sehingga dapat mengganti produksi insulin. Setelah di telusuri obat yang di berikan oleh pihak Rumah Sakit sudah rasional tetapi perlu dimonitoring kembali pemberian obat pada pasien karena pasien tidak patuh dalam meminum obat.

#### **1.2 Saran**

Pasien perlu dimonitoring kembali untuk pemberian obat dikarenakan pasien tidak patuh dalam meminum obat juga puasa karbohidrat. Sehingga menyebabkan pasien tidak mengalami perkembangan selama di Rumah Sakit.

