

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada kasus ini, pasien mengalami CVA infark atau stroke iskemik yang disebabkan oleh gumpalan atau penyumbatan arteri yang menuju ke otak yang sebelumnya sudah mengalami aterosklerosis. Untuk pengobatan pada kasus ini sudah sesuai, namun masih terdapat masalah yang belum tertangani seperti pada nilai kadar laboratorium tinggi dan tidak mendapatkan terapi. Kadar kolesterol, kadar asam urat dan gula darah tinggi masih belum diberikan terapi sehingga direkomendasikan menurunkan kadar kolesterol dengan atorvastatin 40 mg, ibuprofen 200 mg dan insulin humalog lispro 25. Selain itu pada obat pulang juga masih harus diberikan dengan atorvastatin 40 mg, ibuprofen 200 mg dan insulin humalog lispro mix 25 sebagai terapi sekunder pada stroke.

5.2 Saran

Untuk pihak Rumah sakit seharusnya dilakukan kembali tindakan monitoring efek samping pada pasien secara observatif dengan cara menanyakan langsung pada pasien mengenai obat yang telah diberikan. Selain itu juga perlu dimonitor potensi interaksi obat antikoagulan kombinasi yang digunakan oleh pasien yakni clopidogrel dan miniaspi hal ini ditujukan untuk mengurangi kejadian adverse drug reaction (ADR). Apoteker juga seharusnya memonitoring kondisi pasien sesuai dengan nilai lab, agar semua kondisi pasien tertangani dengan baik.