

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan evaluasi terapi obat yang didapatkan untuk pasien stroke iskemik yang diresepkan oleh dokter sudah tepat yaitu pemberian antiplatelet yaitu aspirin. Sedangkan untuk penurunan tekanan darah kurang tepat, seharusnya pemberian captopril diganti dengan obat antihipertensi golongan lain yaitu golongan ARB, CCB atau thiazid. Aturan penggunaan glimepirid seharusnya diubah karena terdapat interaksi dengan aspirin. Perlu adanya monitoring efek samping obat yang dikonsumsi pasien. Standar operasional prosedur di Rumah Sakit Lavalette Malang sudah sesuai dengan permenkes nomor 72 tahun 2016 mulai dari manajemen rumah sakit sampai farmasi klinis. Dapat dikatakan pengobatan untuk Tn H di Rumah Sakit Lavalette sudah cukup efektif.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait penyimpanan obat, sebaiknya dirapikan kembali karena banyak obat yang berada di rak obat tidak sesuai dengan alfabetis dan meningkatkan komunikasi baik dari farmasis maupun tenaga kesehatan lainya dan dilakukan pemantauan efek samping obat pada pasien .