

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis SOAP pada Tn. TK usia 60 tahun di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dengan diagnosis utama GEA dengan penyakit CKD *Stage V*, *elektrolit imbalance* dan terdapat indikasi anemia dengan hipertensi selama berada di rumah sakit. Setelah melakukan pengkajian literatur dapat disimpulkan bahwa terapi GEA yang digunakan Ranitidin, doxycycline, dan loperamide. Terapi *elektrolit imbalance* dengan pemberian infus NS dan RL. Terapi CKD dengan Aminefron, sedangkan untuk hipertensinya dengan kombinasi antihipertensi yaitu golongan ARB Irbesartan dan diuretic loop Furosemide. Terapi anemia dengan ESA Epoetin beta (Neo Rekormon).

5.2 Saran

Bersasarkan hasil analisis SOAP yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Perlu memperhatikan kondisi awal pasien masuk rumah sakit dengan keluhannya dan memberikan terapi yang tepat.
2. Perlu adanya pengecekan laboratorium mengenai pathogen yang menyebabkan pasien mengalami GEA, agar lebih tepat dalam merekomendasikan terapi.