

Bab V

Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemantauan terapi yang didapat oleh pasien Tn. S dengan diagnosis *Low Back Pain* selama masuk rumah sakit hingga keluar rumah sakit telah diberikan pengobatan yang sesuai namun masih ada beberapa pengobatan yang perlu pemantauan dan penyesuaian waktu minum. Pemberian glimepiride pada malam hari dapat meningkatkan risiko hipoglikemia, sehingga perlu dipantau tanda-tanda terjadinya hipoglikemia pada pasien. Penggunaan obat-obat golongan NSAIDs serta gabapentin perlu pemantauan fungsi ginjal dan perhitungan GFR pasien. Pada penggunaan NSAIDs perlu dipantau efek samping pendarahan GI karena usia pasien > 70 tahun.

5.2 Saran

1. Terkait penyimpanan obat di instalasi farmasi terutama rawat inap sebaiknya dipisahkan sesuai golongan obat atau tujuan terapi, sehingga akan lebih mudah dan mempercepat dalam mengambil obat.
2. Form UDD sebaiknya menggunakan software sehingga akan lebih mudah memantau obat yang telah digunakan pasien dan meminimalisir kesalahan serta dapat menghemat waktu.
3. Pemakaian APD (masker dan gloves) saat meracik obat.
4. Rumah sakit sedang melakukan peralihan dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik yang menyebabkan keterbatasan data yang diperoleh penulis sehingga ada beberapa studi kasus yang masih belum bisa dipastikan ketepatan terapinya. Sehingga saran untuk kedepannya mahasiswa PKL diberikan kesempatan atau dibantu untuk melengkapi data-data tersebut.